

The Center for Research Libraries scans to provide digital delivery of its holdings. In some cases problems with the quality of the original document or microfilm reproduction may result in a lower quality scan, but it will be legible. In some cases pages may be damaged or missing. Files include OCR (machine searchable text) when the quality of the scan and the language or format of the text allows.

If preferred, you may request a loan by contacting Center for Research Libraries through your Interlibrary Loan Office.

Rights and usage

Materials digitized by the Center for Research Libraries are intended for the personal educational and research use of students, scholars, and other researchers of the CRL member community. Copyrighted images and texts are not to be reproduced, displayed, distributed, broadcast, or downloaded for other purposes without the expressed, written permission of the copyright owner.

Center for Research Libraries

Scan Date: October 06, 2011

Identifier: d-k-000193



Center *for* Research Libraries

.....
GLOBAL RESOURCES NETWORK

P-00481469

Aus dem Kinderspital Zürich.

Statistische Zusammenstellung
der Todesursachen sämtlicher
in den Jahren 1874 bis 1905 im Züricher
Kinderspital verstorbenen Kinder, gestützt
auf die constatirten Sectionsbefunde.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
der hohen medizinischen Fakultät
der

UNIVERSITÄT ZÜRICH

vorgelegt von

Henia Kulakowsky-Sbarsky
aus Ekaterinoslaw (Russland).

MIDWEST INTER-LIBRARY CENTER

CATEGORY

Genehmigt auf Antrag des Herrn Prof. Dr. O. Wyss.

Druck von J. Me...ttenstr. 27
1907

Deposited by The John Crerar Library

Aus dem Kinderspital Zürich.

Statistische Zusammenstellung
der Todesursachen sämtlicher
in den Jahren 1874 bis 1905 im Züricher
Kinderspital verstorbenen Kinder, gestützt
auf die constatirten Sectionsbefunde.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
der hohen medizinischen Fakultät
der

UNIVERSITÄT ZÜRICH

vorgelegt von

Henia Kulakowsky-Sbarsky


aus Ekaterinoslaw (Russland).

Genehmigt auf Antrag des Herrn Prof. Dr. O. Wyss.

ZÜRICH

Druck von J. J. Meier, Plattenstr. 27

1907



Die untenstehende Statistik, die nach den post mortem ausgeführten Sectionsbefunden und den dabei dictirten Protokollen ausgearbeitet worden ist, soll zeigen, an welchen Krankheiten und in welchen Jahresalter die Sterblichkeit im Züricher Kinderspital am grössten war; resp. wie sich die Todesfälle auf die verschiedenen Krankheiten und verschiedenen Altersjahre verteilen.

Im Laufe von 32 Jahren, vom Jahre 1874—1905 sind im Züricher Kinderspital 1505 Kinder gestorben.

Die Verteilung der Sterbefälle nach den einzelnen Jahren war folgende:

Jahre	m.	w.	Summa
1874	6	6	12
75	9	17	26
76	9	17	26
77	17	5	22
78	18	12	30
79	20	12	32
80	28	25	53
81	29	19	48
82	26	23	49
83	12	30	42
84	24	20	44
85	20	20	40
86	21	30	51
87	11	13	24
88	17	17	34
89	20	23	43
90	19	13	32
91	27	13	40
92	28	27	55
93	31	21	52
94	31	25	56
95	32	25	57
96	46	39	85
97	35	28	63
98	26	33	59
99	32	23	55
1900	31	25	56
1901	35	16	51
1902	39	27	66
1903	35	26	61
1904	42	33	75
1905	36	30	66
	812	693	1505

Wenn die Sterblichkeitszahl in den letzten Jahren zugenommen zu haben scheint, so ist es auf die vergrösserte Zahl der in den letzten Jahren aufgenommenen Patienten zurückzuführen.

Auch zeigt die Tabelle, dass die Zahl der verstorbenen Knaben, diejenige der Mädchen überwiegt. 812 Knaben 693 Mädchen.

Die Verteilung nach dem Alter.

Jahre	Alter						Summa
	0—6	7—12	2—4	5—9	10—14	14—20	
	Mon.	Mon.	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	
1874	4	3	4	1	—	—	
75	—	9	9	6	1	1	
76	11	4	10	1	—	—	
77	5	5	6	5	1	—	
78	4	6	17	1	1	1	
79	9	9	10	2	2	—	
80	12	7	22	8	3	1	
81	10	12	20	6	—	—	
82	6	10	18	14	1	—	
83	4	13	10	11	4	—	
84	11	7	15	9	2	—	
85	6	13	11	8	1	1	
86	9	21	18	3	—	—	
87	2	8	8	4	1	1	
88	10	11	6	5	2	—	
89	6	7	16	9	5	—	
90	2	11	16	3	—	—	
91	3	10	11	10	6	—	
92	12	13	17	11	1	1	
93	7	11	24	9	1	—	
94	11	16	13	10	5	1	
95	15	23	10	4	4	—	
96	34	28	15	6	2	—	
97	14	26	17	4	2	1	
98	16	20	15	5	2	1	
99	12	21	15	4	3	—	
1900	12	22	12	5	3	2	
1901	17	13	15	2	3	1	
1902	24	19	15	4	4	—	
1903	17	16	15	10	3	—	
1904	36	12	15	8	4	—	
1905	24	19	10	10	3	—	
	367	423	435	198	70	12	1505

Wir sehen, dass die grösste Zahl der gestorbenen Kinder auf das Alter von 0—5 fällt.

Aber nicht bei allen diesen gestorbenen konnte die Section vorgenommen werden, bei einigen wurde, meistens auf Wunsch der Eltern, die Section unterlassen.

Verteilen wir die secierten und nicht secierten Fälle auf die einzelnen Jahre, so bekommen wir folgende Tabelle:

Jahre	sec.	nicht sec.	Summa
1874	12	—	12
75	26	—	26
76	25	1	26
77	18	4	22
78	25	5	30
79	31	1	32
80	50	3	53
81	47	1	48
82	46	3	49
83	42	—	42
84	38	6	44
85	38	2	40
86	48	3	51
87	24	—	24
88	32	2	34
89	34	9	43
90	26	6	32
91	36	4	40
92	51	4	55
93	44	8	52
94	51	5	56
95	57	—	57
96	85	—	85
97	61	2	63
98	59	—	59
99	55	—	55
1900	56	—	56
1901	51	—	51
1902	65	1	66
1903	61	—	61
1904	75	—	75
1905	66	—	66
	1435	70	1505

Aus dem gesammelten Material gelangten wir zu folgendem Resultate. Verteilen wir die Todesfälle auf einzelne Jahre und Hauptgruppen, so bekommen wir folgende Tabelle:

Jahre	Angeborene Bildungsfehler, welche den Tod bald od. lang nach d. Geburt herbeif. haben			Gewalt-samer Tod			Infections Krankheiten			Erkrankung des Blutes und Blut-bildenden Organe			Stoff-wechsel Krankh.			Krankheiten der Digestion			Krankh. der Respirat.		
	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.
1874	1	—	1				3	4	7							—	1	1			
75	—	3	3	1	2	3	4	6	10							2	4	6	—	1	1
76	—	2	2				6	8	14							1	4	5	1	1	2
77	4	1	5				8	4	12				1	—	1	2	3	5	1	—	1
78							11	4	15	1	—	1	—	1	1	1	2	3	1	1	2
79				4	—	4	14	7	21							—	5	5			
80							19	16	35							1	3	4	3	—	3
81	1	—	1	—	1	1	20	16	36							3	2	5	1	—	1
82							19	19	38							2	1	3	1	—	1
83	—	2	2				16	14	30				1	—	1	1	2	3			
84	1	—	1				19	16	35				1	—	1	—	2	2			
85							16	15	31							—	1	1	1	3	4
86	—	1	1	1	—	1	16	24	40				—	2	2	1	—	1			
87	2	—	2	2	—	5	7	11	18							2	—	2	1	—	1
88							9	15	24							5	2	7			
89							15	21	36							2	3	5			
90				—	2	2	11	12	23				—	2	2	2	—	2	1	1	2
91	1	—	1	1	—	1	21	13	34	1	—	1				5	2	7	1	—	1
92	—	3	3				14	21	35				—	1	1	1	3	4	3	3	6
93	—	2	2	—	1	1	22	14	36							1	2	3			
94	—	1	1	1	—	1	23	18	41							1	2	3			
95	1	1	2				15	10	25				1	—	1	2	5	7	3	5	8
96	1	1	2	—	1	1	30	15	42				1	3	4	6	8	14	3	2	5
97	3	—	3	1	—	1	26	14	40				—	1	1	3	6	9	—	4	4
98	2	2	4	—	1	1	9	22	31							9	4	13	3	2	5
99	—	2	2	1	—	1	18	12	30							8	2	10	1	4	5
1900	—	1	1	1	—	1	18	16	34				1	2	3	4	3	7	2	—	2
1901	3	2	5	2	—	2	15	5	20				2	—	2	7	3	10	1	2	3
1902	4	2	6	1	—	1	19	14	33	—	1	1	—	1	1	6	9	15	2	4	6
1903	—	—	—	2	—	2	13	14	27				—	1	1	8	6	14	5	1	6
1904	9	—	9	1	2	3	12	12	24				—	2	2	15	6	21	1	3	4
1905	4	—	4				18	21	39				2	1	3	8	6	14	4	2	6
	40	24	64	18	12	30	482	433	915	2	1	3	10	17	27	107	101	208	41	39	80
	4,22%			1,96%			60,73%			0,19%			1,79%			13,82%			5,31%		

Verteilung nach den Haupt-

Jahre	Angeborene Bildungsfehler, welche d. Tod bald od. später herbeigef. haben			Gewalt-samer Tod			Infections-Krankheiten			Erkrankung d. Blutes u. Blutbildend. Organe			Stoff-wechsel Krankh.			Krankh. der Digestions-organe			Krankh. der Respirat.		
	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	31	21	52	2	1	3	64	46	110				1	5	6	69	65	134	11	5	16
$\frac{1}{2}$ —1	7	2	9	4	2	6	149	124	273				8	8	16	19	17	36	23	20	43
2—4	1	—	1	9	5	14	183	146	329	1	1	2	1	4	5	9	6	15	5	11	16
5—9	1	—	1	3	2	5	67	88	155							5	7	12	1	2	3
10—14	—	1	1	—	2	2	16	28	44	1	—	1				5	5	10	1	—	1
15—20							3	1	4							—	1	1	—	1	1
	40	24	64	18	13	30	482	433	915	2	1	3	10	17	27	107	101	208	41	39	80

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass den grössten Teil der Sterbefälle die Infections- und Digestions-Krankheiten aufweisen. Bei den Infections-Krankheiten war das Alter von 0—5, bei den Digestions-Krankheiten das Alter von 0—1 am meisten betroffen. Dann kommen die folgenden Krankheiten nach der Sterbezahl: Krankheiten der Respirationsorgane am meisten im Alter von 0—5, Bildungsfehler von 0—1, Krankheiten der Haut von 0—2 Jahre, Krankheiten des Nervensystems 0—5, Gewalt-samer Tod von 1—5. Bei den übrigen Krankheiten war die Sterblichkeit nicht gross.

Was das Geschlecht anbelangt, so zeigte sich, dass an Infectionskrankheiten mehr Knaben als Mädchen gestorben sind.

gruppen und Alter.

Krankh. d. Circulat.			Krankh. d. Nerven-systems			Krankh. d. Sinnes-organe			Krankh. d. Harn-organe			Krankh. d. männl. Geschlechts-organe			Krankh. d. Haut			Krankh. d. Knochen-systems			Tumoren		
m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.	m.	w.	Sa.
1	1	2	8	8	16	3	—	3	—	3	3				21	9	30	—	1	1	1	5	6
—	1	1	9	5	14	3	2	5	2	3	5	1	—	1	13	3	16	—	2	2	5	2	7
2	1	3	4	2	6	3	1	4	1	3	4				3	2	5	2	—	2	3	2	5
2	1	3	1	2	3				—	1	1										1	—	1
5	2	7	1	1	2				—	2	2										—	2	2
									2	1	3							—	1	1			
10	6	16	23	18	41	9	3	12	5	13	18	1		1	37	14	51	2	4	6	10	12	22

(481 Knaben, 433 Mädchen). Bei den Digestionskrankheiten war die Sterblichkeit bei den Geschlechtern fast gleich. 107 Knaben, 101 Mädchen), das gleiche wie im letzten Falle war auch bei den Respirationskrankheiten. Bei den Bildungsfehlern überwiegt bedeutend die Sterblichkeit bei den Knaben: 40 Knaben gegen 24 Mädchen.

Wenn man die einzelnen Jahre vergleicht, sieht man, dass die Sterblichkeit von Infectiouskrankheiten am meisten auf die Jahre 1896, 1894, 1905, von Digestionskrankheiten auf 1896 bis 1905, von Respirationskrankheiten auch auf die letzten Jahre von 1895 bis 1905 fällt.

*) Vgl. Normenkultur 191.

d. **Pes varus** 1 (Knabe von 21 Tag).

e. **Vitia cordis congenita**

Complicationen:

Nephritis parenchym.	2
Enteritis	1
Bronchitis	1
Atelectase der Lnnge	1
mit Nebenkrankheiten	
Rachitis	2
Atrophie des Darmes	1
Hernia inguinalis	1
Klumpfüsse	1

Total 10

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	3	4	7
$\frac{1}{2}$ —1	—	1	1
2—4	1	—	1
5—9	—	—	—
10—14	—	1	1
	4	6	10

f. **Ectopia vesicae**

Complic.-Sepsis (Knabe von $1\frac{3}{4}$ Jahre).

g. **Megalocolie** 1 (Knabe von 10 Mon.).

h. **Microcephalie**

Compl. Convulsionen 1 (Knabe von 3 Mon.).

Spastische spinalparalyse und Meningitis 1 (Knabe von $1\frac{1}{4}$ Jahren).

i. **Encephalocele frontalis** 1 (Knabe von 8 Tag).

mit Nebenkrankheiten

Hypospadie 1 (Knabe von 3 Mon.).

k. **Atresia ani**

vaginalis mit Dilatatio recti et coli 1 (Mädchen, 1 Jahr).

vestibulare mit Complic. Peritonitis 1 (Mädchen, 37 Tag).

mit Nebenkrankh. Hernia scrotalis 1 (Knabe, 10 Mon.).

Total 3

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	1	1	2
$\frac{1}{2}$ —1	2	2	4
2—4	7	4	11
5—9	2	1	3
10—14	—	1	1
	12	9	21

II. Gewaltsamer Tod.

a. **Combustio** 21.

b. Fractura

cranii mit Complic:

Meningitis purulenta	1
Pneumonia catar.	1
Commotio cerebri	2
Fractura femoris	3

Total 7

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	1	—	1
$\frac{1}{2}$ —1	2	—	2
2—4	2	1	3
5—9	—	1	1
	5	2	7

c. Intoxicatio mit Guajacol (Mädchen 9 Jahre).

d. Chloroformtod (Knabe $8\frac{1}{2}$ Jahre).

III. Infectiouskrankheiten.

a. Diphtherie.

Auf die einzelnen Jahre verteilt.

Jahre	m.	w.	Summa
1874	3	3	6
75	—	4	4
76	1	7	8
77	6	2	8
78	3	2	5
79	8	5	13
80	14	11	25
81	14	13	27
82	17	14	31
83	14	7	21
84	13	11	24
85	7	7	14
86	9	17	26
87	5	8	13
88	6	7	13
89	13	15	28
90	6	6	12
91	11	7	18
92	10	11	21
93	18	10	28
94	13	11	24
95	6	7	13
96	6	6	12
97	12	5	17
98	4	8	12
99	6	5	11
1900	6	4	10
1901	5	2	7
1902	2	2	4
1908	1	1	2
1904	—	—	—
1905	1	—	1
	234	223	457

50% aller Infectiouskrankheiten. 30,36% der sämtlichen Sterbefälle.

Diphtherie nach dem Alter verteilt.

Jahre	m.	w.	Summa
0— $\frac{1}{2}$	5	10	15
$\frac{1}{2}$ —1	68	65	133
2—4	117	98	215
5—9	39	44	83
10—14	3	6	9
15—20	2	—	2
	434	223	457

Von den obigen Zahlen kommen auf die Diphtheria pharyngis und laryngis 445 Fälle, auf alle übrigen 12.

Diphtheria pharyngis et laryngis.

Complicationen:

Bronchitis	2
Pneumonia catarr.	139
„ supur.	6
„ crouposa	6
Pneum. cat. et Neph. parench.	87
„ „ „ Pleuritis fibr.	19
„ „ „ Pleurit. sup.	1
Pleuritis	2
Nephritis parench.	43
Enteritis acuta	5
Paralysis cordis	8
Postdiphtherische Lähmung	2
Endocarditis	4
Spasmas glottidis	1
Atelectase d. Lunge	1
Ekzema Diphtherie	1
Ulcus Diphther. oesophag.	1
Allgem. Sepsis	1
Stenosis laryngis	1
ohne Complication	116
Total	445

Diphtheria conjunctivae.

Complic.:

Pneum.u.Neph.r.parench.	1
Ekzema capillit.	2
„ universalie	2
	5

Diphtherie der Nase

Complic.:

Nephritis parench.	2
Pneum. catar	1
Mit Nebenkrankheiten	
Tuberculose	1

Total 4

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	2	2
$\frac{1}{2}$ —1	1	—	1
2—4	1	—	1
5—9	1	—	1
	3	2	5

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	—	—
$\frac{1}{2}$ —1	3	—	3
2—4	—	1	1
	3	1	4

Diphtherie der Haut

nach. Ekzem	1 (Mädchen, 8 Mon.)
„ „	1 (Mädchen, 2 Mon.)
Opthalmitis diphth.	1 (Knabe, 9 Woch.).

b. Scarlatina-Diphtherie

mit Complic.:

Nephritis parenchym.	6
Pneum. catar. und Neph.r.	
parench.	2
Pneumonia cat. und	
Bronchitis purul.	1
Sepsis	1
ohne Complication	8

Total 18

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	—	—
$\frac{1}{2}$ —1	2	2	4
2—4	7	3	10
5—9	1	3	4
10—14	—	—	—
	10	8	18

c. Scarlatina

mit Complic.:

Nephritis parench.	8
Pneumonia catar.	3
Pneum.cat.Arthritis purul.	1
Myocarditis	1
Meningitis purul.	1
Phlegmone d. Ellenbogen	1
Sepsis	9
ohne Complication	1

Total 25

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	—	—
$\frac{1}{2}$ —1	2	—	2
2—4	7	5	12
5—9	4	3	7
10—14	2	2	4
	15	10	25

d. Typhus abdominalis

Complic.:

Pneumonia catar.	2
Pneum. catar. und Noma	1
Total	3

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	—	—
$\frac{1}{2}$ —1	1	—	1
2—4	—	1	1
5—9	1	—	1
	2	1	3

e. Morbilli

Complic.:

Pneum. catar. und	
Pleuritis fibrin.	2
Pleuritis purul.	2
Pleuropneum. und	
Pericarditis pur.	1
Pleuropneum. und	
Endocarditis	1
Enteritis acuta	1
Total	7

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	1	1
$\frac{1}{2}$ —1	3	1	4
2—4	1	—	1
5—9	—	1	1
	4	3	7

f. Pertussis

Complic.:

Pneum. catar.	8
---------------	---

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	1	—	1
$\frac{1}{2}$ —1	1	3	4
2—4	1	2	3
	3	5	8

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	—	—
$\frac{1}{2}$ —1	1	—	1
2—4	1	1	2
5—9	1	—	1
	3	1	4

g. Tetanus 4

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	1	—	1
$\frac{1}{2}$ —1	—	1	1
2—4	1	—	1
5—9	—	1	1
	2	2	4

h. Variola

Complic.:

Empyema Pleurae	1
mit Nebenkrankheiten	
Rachitis	2
Spondylitis	1
	4

i. **Varicellae** 1 (Knabe von 1 Jahr)

k. **Omphalitis**

Complic.:

Peritonitis 1 (Knabe von 6 Woch.)

ohne Complic. 1 (Knabe von 10 Mon.).

l. Pneumonia crouposa

mit Complic.:

Pleuritis fibrin. und Thrombosis

Art. purul.

1

Pleuritis purul. und Pericard. purul.

1

Pleuritis purul.

1

Pleuritis purul. et Nephritis

parench.

2

Nephritis parenchym.

5

Vitum cordis

3

Meningitis serosa

1

" " purulenta

1

ohne Complic.

6

mit Nebenkrankheiten

Enteritis acut.

2

Rachitis

2

Total 24

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	3	—	3
$\frac{1}{2}$ —1	10	9	19
2—4	—	—	—
5—9	—	1	1
10—14	—	1	1
	13	11	24

m. Osteomyelitis acut.

Complic.

Periostitis purul.

1

Endocarditis

1

Meningitis purul.

1

Nephritis parench.

1

Sepsis

2

ohne Complic.

4

Total 10

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	1	1	2
$\frac{1}{2}$ —1	—	1	1
2—4	1	1	2
5—9	1	1	2
10—14	2	1	3
	5	5	10

Erysipel n. d. Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0 — $\frac{1}{2}$	10	4	14
$\frac{1}{2}$ — 1	3	4	7
2 — 4	—	1	1
5 — 9	—	—	—
10 — 14	1	—	1
	14	9	23

n. Erysipelas

1. des Kopfes	
mit Complic.:	
Phlegmone d. Kopfschwarte	1
und Meningitis purul.	1
Nephritis parench.	2
Endocarditis	1
Gastro-Enteritis	2
ohne Complication	2
Total	8

2. Erysipelas des Gesichts

Complic.

Phlegmone d. Kopfes	1
Enteritis	1
ohne Complication	2
Total	4

3. Erysipelas des Gesichts und Kopfes

mit Nebenkrankheiten Hydrocephalus chr.	1
Enteritis chron.	3
Total	4

4. Erysipel der Perinealgegend, Ursache Perinealplastik in Folge d. Anus perinealis

1

5. Erysipel d. Scrotum, Penis, Oberschenkel mit septischer Peritonitis

1

6. Erysipel d. Brust, Oberarm, Gesichts

1

7. „ d. Armes

1

8. „ des Rückens

1

9. „ der Inguinalgegend mit septischer Peritonitis

1

10. Erysipelas universale

1

Total 23

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0 — $\frac{1}{2}$	5	3	8
$\frac{1}{2}$ — 1	2	1	3
2 — 4	1	1	2
	8	5	13

o. Phlegmone

1. der Kopfschwarte

Complic.:

Pneumonia cat.	1
Atrophia infant	1
m. Nebenkrankh. Luescougenita	1
Total	3

1. Phlegmone des Armes

Complic.:

Sepsis 2

Meningit. pur. 1

Total 3

2. Phlegmone d. Unterschenkel

Complic.:

Pneum. cat. 1

ohne Complication 1

Total 2

3. Phlegmone d. Rückens

Complic.:

Erysipelas 1

Bronchopneum. 1

2

4. Phlegmone d. Oberschenkels

Complic.:

Bronchitis fib. 1

5. Phlegmone d. Halses 1

6. Phlegmone multiplex. 1

Total 13

p. **Blenorrhoe neonat.** 1 (Mädchen, 21 Tag.)

Syphilis nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0—1/2	22	13	35
1/2—1	3	4	7
2—4	3	1	4
5—9	1	—	1
	29	18	47

q. **Syphilis congenita**

1. Syphilis der Haut

Complic.:

Nephritis parench. 2

Nephritis par. u. Pneum. cat. 1

Pneumonia cat. 3

Enteritis cat. 2

Atrophia inf. 2

ohne Complicat. 6

mit Nebenkrankh. Miliartuberc. 1

Total 17

2. Syphilis der Haut mit gummöser Lebercirrhose

Complic.:

Pneum. cat. 2

3. Syphilis der Haut und Knochen

Complicat.:

Enteritis acut.

2 Syphilis nach dem

Nephritis par.

1 Alter verteilt.

Pneum. cat.

1

4

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	22	13	35
$\frac{1}{2}$ —1	3	4	7
2—4	3	1	4
5—9	1	—	1
	29	18	47

4. Syphilis der Knochen

Complic.:

Pneum. catar.

2

Pneum. und Neph. par.

2

Nephritis parench.

1

Peritonitis dif.

1

Meningitis sup.

1

ohne Complic.

1

Total 8

5. Syphilis d. Knochen und Leber

2

6. Syphilis d. Gelenke (Kniegelenk und Ellbogengelenk) und Gumma Epididymis

1

7. Syphilis d. Knochen und des harten Gaumens

1

8. Syphilis d. Knochen und Larynx mit Pneum. cat.

1

9. Syphilis d. Larynx. (ulcera)

Complic.

Pneum. cat.

1

Nephritis par.

1

2

10. Syphilis d. harten Gaumens

Complicat.

Pneum. cat.

1

Enteritis

1

Total 2

11. Syphilis der Leber

Hepatitis interstit. luetica

2

Gumma hep. Comp. Pneum.

1

3

12. Syphilis d. Leber und Milz. Comp. Pneum.

2

13. Syphilis d. Milz (gumma)

Complic. Meningitis und Pleuritis sup.

1

14. Syphilis d. l. Niere (gumma)

Complic. Pneum. cat.

1

Total 47

c. Tuberculose. Auf einzelne Jahre verteilt.

Jahre	m.	w.	Summa
1874	—	1	1
75	1	1	2
76	4	1	5
77	2	2	4
78	1	2	3
79	3	—	3
80	1	4	5
81	3	2	5
82	1	2	3
83	1	4	5
84	3	5	8
85	4	1	5
86	6	3	9
87	2	1	3
88	3	8	11
89	—	4	4
90	5	5	10
91	5	4	9
92	2	5	7
93	3	3	6
94	8	6	14
95	8	3	11
96	18	2	20
97	5	4	9
98	2	10	12
99	7	6	13
1900	7	7	14
1901	6	1	7
1902	12	9	21
1903	6	4	10
1904	3	6	9
1905	6	12	18
	139	127	266

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	16	11	27
$\frac{1}{2}$ —1	53	34	87
2—4	43	29	72
5—9	19	34	53
10—14	7	18	25
15—20	1	1	2
	139	127	266

26,04% aller Infektionskrankheiten.

17,67% der sämtlichen Sterbefälle.

a. Tuberculosed. Knochen u. Gelenke

1. Coxitis tbc.

mit Complic.:

Tuberc. univers. 6

" " u. Otitis media 1

Meningitis tbc. 2

Tbc. d. Drüsen 4

" Pulmon. 4

" d. Lungen und Niere 5

Peritonitis tbc. 1

Pericarditis u. Myocard. pur. 1

Pleuritis und Neph. par. 1

Osteomyelitis femor. 1

Pneumonia cat. 1

Pyämie 3

ohne Complic. 7

Total 33

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	—	—
$\frac{1}{2}$ —1	3	3	6
2—4	5	7	12
5—9	3	7	10
10—14	1	3	4
15—20	1	—	1
	13	20	33

2. Gonitis tbc.

Complic.:

Tubercul. univers. 5

Tubercul. pulm. 2

Osteomyelitis fem. 1

Pneum. cat. 1

Total 9

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	1	1
$\frac{1}{2}$ —1	4	—	4
2—4	—	—	—
5—9	2	1	3
10—14	—	1	1
	6	3	9

3. Spondylitis tbc.

Complic.:

Tbc. d. Lymphdrüs. u. Lunge 11

Tbc. universalis 6

Meningitis spinalis 1

Compressio Tracheae 1

Pleuritis purul. 2

Nephritis parench. 1

Perinephritis 1

Total 23

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	—	—
$\frac{1}{2}$ —1	1	—	1
2—4	11	3	14
5—9	—	5	5
10—14	1	2	3
	13	10	23

4. Tbc. des temporale

Complic.:

Tbc. univers.	3
Meningitis tbc.	2
Tbc. d. Lunge	2
" " " u. Peritoneum	1
Empyem d. Pleura	1
Total	9

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	1	1
$\frac{1}{2}$ —1	2	2	4
2—4	1	1	2
5—9	1	1	2
	4	5	9

5. Tbc. d. Knochen. Basis cranii

Complic.:

Meningitis tbc.	3
-----------------	---

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	—	—
$\frac{1}{2}$ —1	—	1	1
2—4	—	—	—
5—9	—	—	—
10—14	—	2	2
	—	3	3

6. Tbc. d. Scapula

Complic. Meningit. Tbc. (Knabe von 1 J. 8 M.).

7. Tbc. Beider Extremitäten.

Complic.:

Peritonitis und Meningit tbc.	1	} 2 Knaben von 7 Jahre.
Tbc. d. Drüsen	1	

8. Tbc. d. Armes

Complic.:

Tuberc. univers.	1
Tbc. d. Lungen u. Bronchialdrüsen	2
	3

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
$\frac{1}{2}$ —1	—	1	1
2—4	1	1	2
	1	2	3

9. Spina Ventosa

Complic.:

Tbc. d. Lungen und Mening. 1 (Knabe von 3 Jahren)

" universalis 1 (Knabe von 1 Jahr).

10. Tbc. os tarsi mit Complic. tbc. universal. 1

(Knabe von $1\frac{3}{4}$ Jahr).

11. Tbc. d. Knochen d. Gesichts mit Complic. Tbc. d. Lunge.

12. Tbc. d. Unterkiefer

Complic.:

Tbc. d. Bronchialdrüsen (Mädchen von 1 Jahr 9 Mon.)

„ „ Lungen und Drüsen (Knabe von 1 Jahr 6 Mon.).

13. Empyema des Antrum Higmori

Complic.:

Endocarditis (Mädchen von 3 Mon.).

Total 90 Knochen- und Gelenk-Tuberculose.

b. Tuberculose der Respirationsorgane.

Tubercul. d. Larynx

Complic.: Tubercul. universalis 1 (Knabe 1 $\frac{1}{2}$ Jahre).

Tubercul. d. Lunge

Complic.:

Tbc. d. Lymphdrüsen 5

Pleuropneum. 2

Pleuritis purul. 4

Otitis media. 1

Nephritis parench. 2

Gastro Enteritis 3

ohne Complic. 6

Total 23

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	3	1	4
$\frac{1}{2}$ —1	3	5	8
2—4	4	1	5
5—9	2	3	5
10—14	—	1	1
	12	11	23

c. Tuberculose d. Meningen

Meningitis tbc.

Complic.:

Pneum. catar. 2

Peritonit. fibr. 1

Nephritis parench. 1

Rachitis u. Hydrocephalus 1

Ursache: tbc. universalis 42

tbc. Lungen u. Drüsen 13

ohne Complic. 2

Total 62

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	1	2	3
$\frac{1}{2}$ —1	6	8	14
2—4	13	10	23
5—9	4	11	15
10—14	2	5	7
	26	36	62

d. Tubercul. d. Lymphdrüsen

Tbc. d. Mesenterialdrüsen

Complic.:

Peritonitis tbc. 3

Sepsis 1

Tbc. d. Bronchialdrüsen

Complic. Pneum. 2

Total 6

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	—	—	—
$\frac{1}{2}$ —1	2	1	3
2—4	—	—	—
5—9	1	1	2
10—14	1	—	1
	4	2	6

e. Tubc. d. Verdauungsorgane

Peritonitis tbc.

Ursache:

Tbc. d. Lungen, Drüsen
und Mening. 4

Tbc. d. Lungen u.

Drüsen 11

Tbc. universalis 1

Total 16

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	1	1	2
$\frac{1}{2}$ —1	3	3	6
2—4	4	1	5
5—9	—	1	1
10—14	1	1	2
	9	7	16

f. Tubercul. d. Harnwege

Tbc. Renis et vesicae

Complic.

Peritonitis tbc. 2

2 Mädchen von 13 $\frac{1}{2}$ -
und 10 Jahren.

g. Tuberculosis universalis

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	8	2	10
$\frac{1}{2}$ —1	20	10	30
2—4	5	9	14
5—9	2	4	6
10—14	—	3	3
	35	28	63

h. Tubercul. der Haut

Lupus

Complic.:

Tbc. universalis 1 (Mädchen von 9 $\frac{1}{2}$ Jahre)

„ pulm 1 (Knabe von 9 Mon.).

Aus dem oben genannten kommen wir zum Schluss, dass der grösste $\%$ -Satz der Sterblichkeit von Infektionskrankheiten auf die Diphtherie fällt (50 $\%$) und zwar auf Diphtherie des Pharynx und Larynx.

Das Alter von $\frac{1}{2}$ bis 5 Jahren inclusive war am meisten betroffen; von 0 bis $\frac{1}{2}$ Jahr war die Zahl der Todesfälle relativ gering.

Bei der Verteilung auf verschiedene Jahre, zeigte es sich, dass die Sterblichkeit an Diphtherie vom Jahre 1896 an stark abgenommen hat, so dass wir von den letzten Jahren nur einzelne Fälle konstatieren können.

1903	2 Fälle
1904	0 „
1905	1 Fall

Dieses haben wir dem Diphtherie-serum zu verdanken, das in den letzten Jahren, seit 1895 im Spital angewendet worden ist.

Nach der Diphtherie folgt die Tuberculose mit 29 $\%$ der Sterblichkeit (von Infektionskrankh.) und zwar am meisten im Alter von $\frac{1}{2}$ bis 1 Jahr inclusive.

Aber im Gegensatz zu Diphtherie hat die Sterblichkeit durch Tuberculose seit dem Jahre 1894 zugenommen.

Bei der Localisation der Tuberculose kommt an erster Stelle die Knochen-Tuberc. mit 90 Fällen, Meningitis-Tbc. 62, Tbc. universal. 64, Tbc. der Lunge 23.

IV. Erkrankung des Blutes und der blutbildenden Organe.

Leukaemia 1 (Mädchen von $2\frac{3}{4}$ Jahren).

Anaemia perniciosa simplex 2 (1 Knabe von 4 und 1 von 11 Jahren).

V. Stoffwechselkrankheiten.

Rachitis

Complic.:

Laryngospasmus	1
Pneumonia catar.	6
Rippenfract. u. Pneum. cat.	2
Bronchitis capillaris	3
Gastro-Enteritis	3
Atrophia infant.	1
Hydrocephalus	2
Multiple Fracturen	3
Furunculosis	1
ohne Complic.	5

27

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0 — 1/2	1	5	6
1/2 — 1	8	8	16
2 — 4	1	4	5
5 — 9	—	—	—
10 — 14	—	—	—
	10	17	27

VI. Krankheiten der Digestionsorgane.

Parotitis sup.

Ursache: Eitrige Entzündung d. Mandibulargelenks

(Knabe von 1 Mon. 14 Tag).

Pharyngitis mit

Complic.:

Laryngitis und Bronchitis fibr. 1 (Knabe von 10 Mon.).

Nach dem Alter.

Abscessus retropharyngeus

Complic.:

Arodierung der Carotis	1
Compressio d. Larynx	1
	2

Jahre	m.	w.	Sa.
0 — 1/2	1	—	1
1/2 — 1	1	—	1
		2	2

Abscessus hepatic. traumat (Mädchen von 15 Jahren).

Abscess d. Darmes

Complic.: Peritonitis purul (Mädchen von 8 Jahren).

Ulcera ventriculi numeros. 1 (Mädchen von 5 Mon.).

Gastro-Enteritis acut. catar.

Complic.:

Atrophia infant.	20
Bronchitis	1
Atelect. pulm.	2
Pneum. cat.	10
Pneum. und Neph. par.	2
Nephritis parench.	5
Peritonitis	2
Icterus	1
Prolapsus recti	3
Hydrocephalus	2
Ekzem	1
Multiple Phlegmone	1
Rachitis	2

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	39	39	78
$\frac{1}{2}$ —1	7	10	17
2—4	2	1	3
5—9	—	—	—
10—14	—	1	1
	48	51	99

Mit Nebenkrankh.	
Blennorrhoe neon.	3
Paralysis plex. Brachialis	1
Paraplegia	1
Lues	1
ohne Complic.	41

Total 99

Gastro-Enteritis chron.

Complic. Anaemie	1 (Mädchen von 2 Mon.).
Atrophia inf.	1 (Knabe von 7 Mon.).
Eclampsia	1 (Mädchen von 2 Mon.).
	3

Gastro-Enteritis hämorrhag. 1 (Mädchen von 5 Mon.).

Gastro-Enteritis gangränosa

Complic.

Sepsis	1 (Knabe von 14 Mon.).
Enteritis septic	1 (Mädchen von 6 Mon.).
Enteritis ulcerosa	

Complic.

Atrophia inf.	1 (Knabe von 6 Mon.).
Pneum.	1 (Mädchen von 6 Mon.).

Stenosis Pylori congenit 2 (1 Knabe von 1 Mon., 1 Mädchen von 10 Mon.)

Strictura oesophag. ulcerativa
mit Perforat. -u. Neph. parench. 1 (Knabe von 1 Jahr).

Stenosis oesophagea
ohne Perforation 1 (Knabe von 4 Jahren).

Querer Darmschluss

Complic.:

Perforation und Blutaustritt im Abdomen 1 (Knabe v. 1 1/2 Tag).

Invaginatio intestini

Complic.:

Perforation und Peritonitis 1 (Knabe von 4 Jahren).

Prolapsus recti

Complic.:

Atrophia inf. 3

Peritonitis localis 1

4

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0—1/2	1	2	3
5—9	1	—	1
	2	2	4

Cholera infantum 2 (1 Mädchen von 2 Jahren und 1 Mädchen von 4 Mon.).

Icterus chron. infant. 1 (Knabe von 5 Mon.).

Typhlitis und Appendicitis perfor.

Complic.:

Peritonitis purul. 28

Typhlitis und Appendic. nicht perfor.

Complic.:

Nephritis parench. 1

Total 29

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0—1/2	1	—	1
1/2—1	1	2	3
2—4	3	5	8
5—9	4	3	7
10—14	5	5	10
	14	15	29

Hernia

a. Hernia inguinal incarcerata 3

b. Hernia inguinalis mit Complic.

Atrophia inf. 2

ohne Complic. 2

Hernia scrotalis Complic.

Peritonitis sup. 1

Hernia umbilicalis m. Rachitis 1

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0—1/2	6	—	6
1/2—1	2	—	2
2—4	1	—	1
	9	—	9

Peritonitis purul.

Ursache Gastro-Enteritis 1 (Mädchen von 5 Jahren)
 unbekannte Ursache 2 (Knabe von 1 und Mädchen
 von 7 $\frac{1}{2}$ Mon.).

Atrophia infantum

Complic.

Gastro-Enteritis 14

Pneum. und Gastro-Enteritis 2

Rachitis 2

Scrophulosis 1

ohne Complic. 18

Total 37

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	20	10	30
$\frac{1}{2}$ —1	4	2	6
2—4	—	—	—
5—9	1	—	1
	25	12	37

VII. Krankheiten der Respirationsorgane.

Laryngitis catar.

Complic.

Pneum. cat. 7

Pseudocroup. 4

mit Nebenkrankh.

Rachitis 1

Laryngitis ulcerosa

Complic.

Pneum. cat. 1

Total 13

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	2	2	4
$\frac{1}{2}$ —1	3	6	9
2—4	—	—	—
5—9	—	—	—
	5	8	13

Spasmus glottidis

mit Nebenkrankheiten. Gastro Enteritis 2 (1 Knabe u.
 1 Mädchen von 0—6 Mon.).

Bronchitis acut.

Complic.

Pneum. cat. 2

Oedema pulm. 1

Atrophia inf. 1

Total 4

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	2	—	2
$\frac{1}{2}$ —1	2	—	2
	4		4

Pneumonia catar.

Complic.:

Nephritis par.	7
Pleuritis fib.	5
Pleuritis sup.	3
Pseudocroup	3
Laryngostenose	1
Oedema pulm.	1
Atrophia inf.	2
Enteritis acut.	3
Hydroceph. chr.	1
als Ursache Rachitis	6
ohne Complic.	7

Total 39

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	5	2	7
$\frac{1}{2}$ —1	10	11	21
2—4	8	1	9
5—9	—	1	1
10—14	—	—	—
15—20	—	1	1
	23	16	39

Gangränä pulm.

Ursache Postdiphtheritische

Pneum.	1
Fremdkörperaspirat.	1
Phtisis pulm.	1
	3

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
2—4	1	1	2
10—14	1	—	1
	2	1	3

Pneumonia purulenta

Ursache Nabelinfection (Mädchen von 2 Mon.).

Geheilte Diphtherie (Knabe von 3 Jahren).

Fremdkörperaspiration

Comp. Pneum. cat. 3 (2 Knaben und 1 Mädchen von 7 Mon.).

Nach dem Alter.

Pleuritis suppur.

Ursache: Pneum. cat.	11
Varicellae	1
Lues congenit	1
Nicht bekannte Ursache	1
Total	14

Jahre	m.	w.	Sa.
0— $\frac{1}{2}$	1	—	1
$\frac{1}{2}$ —1	5	1	6
2—4	3	2	5
5—9	1	1	2
10—14	—	—	—
	10	4	14

VIII. Krankheiten der Circulationsorgane.

Endocarditis

Ursache Gelenkrheumat.	6
Scharlach	1
Keuchhusten	1
Pneum. cat.	2
nicht bekannte Ursache	2
Total	12

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0 — $\frac{1}{2}$	—	1	1
$\frac{1}{2}$ — 1	—	—	—
2 — 4	2	—	2
5 — 9	2	1	3
10 — 14	6	—	6
	10	2	12

Hypertrophia und dilatatio cordis

nicht bekannte Ursachen 2

unter diesen 1 Fall mit secundär. Pericard. (2 Mädchen von 2 und 12 Jahren.)

Lymphadenitis axillaris suppurativa

Ursache Rachitis Rippenfract	1 (Knabe von 6 Mon.)
unbekannte Ursache	1 (Mädchen von 11 Mon.)

IX. Krankheiten d. Nervensystems.

a. Hirnkrankheiten

Pachymeningitis hämorrhg. inter.

Complic.:

Hydrocephalus	2
Atrophia univers.	1
Nebenkrankh. Rachitis	1
Total	4

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
$\frac{1}{2}$ — 1	—	1	1
2 — 4	1	1	2
5 — 9	—	—	—
10 — 14	1	—	1
	2	2	4

Meningitis purulenta

Ursache Rachitis Pneum.	1
nicht bekannte Ursache	2
	3

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0 — $\frac{1}{2}$	—	2	2
$\frac{1}{2}$ — 1	1	1	2
2 — 4	—	—	—
5 — 9	—	1	1
	1	4	5

Abscessus cerebri

Complic. Meningitis pur. und Pyämie 1 (Mädchen von 6 Wochen).

Hydrocephalus congenit.

Complic. :

Meningitis serosa	4
„ purul.	1
Mening. cerebro spin. pur.	2
Hyperämie cerebri	1
Panophthalmie	1
Pneum. cat.	2
Atrophia inf.	2
ohne Complic.	12

Total 25

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0—1/2	5	4	9
1/2—1	7	3	10
2—4	3	1	4
5—9	1	1	2
	16	9	25

b. Rückenmarkskrankheiten

Myelitis acuta (Myelomalacia nach Venenthrombose)

Ursache Tumor im Rückenmark (Mädchen v. 14 Jahren).

Poliomyelitis anter. acut, infant.

Complic. Hydrocephalus und Pneum. cat. 1 (Knabe von 2 Monaten).

c. Nervenkrankheiten

Paralysis essential. infant.

Ursache Scharlach 1 (Knabe von 10 Mon.)

d. Neurosen

Eclampsia infant.

Mit Nebenkrankheiten Atrophia inf. u. Gastro-Enteritis 1

Hernia inguinalis 1

Rachitis 1

3

(2 Knaben und 1 Mädchen von 0—9 Mon.)

X. Krankheiten der Sinneswerkzeuge.

Otitis media purul.

Ursache:

Stomatitis ulcer. und Bronch.

purul. 1

Pneum. und Pleur. purul. 1

Ostitis und Periostitis purul.

u. Necrose d. Proc. mastoid 6

(alle mit Complic.-Mening. purul.)

Miliartuberculose 1

Palatum fissum 1

nicht bekannte Ursache

m. Complic.-Mening.pur. 1

Total 11

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0 — $\frac{1}{2}$	3	—	3
$\frac{1}{2}$ — 1	3	1	4
2 — 4	3	1	4
	9	2	11

Otitis externa

Complic.:

Abscessus retropharyngealis 1 (Mädchen von 1 Jahr).

XI. Krankheiten der Harnwerkzeuge.

Nephritis parenchymatosa

Ursache:

Bronchitis acut. 2

Pneumonia catarr. 2

Tracheobronchitis u. Enter. ac. 2

Gastro-Enteritis 2

Ekzem. u. Pneum. 2

Otitis media 1

Rachitis 1

Masern 1

Scarlatina 1

Geheilte Lungentuberc. 1

Total 15

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0 — $\frac{1}{2}$	—	1	1
$\frac{1}{2}$ — 1	2	3	4
2 — 4	1	3	5
5 — 9	—	1	1
10-14	—	2	2
15-20	1	1	2
	4	11	15

Hydronephrose

mit angeborener Erweiterung d. Nierenbecken 1 (Knabe
von 2 Mon.)

Pyonephrose

Ursache:

Angeborene Nierencyste, die in Vereiterung tritt 1
(Mädchen von 6 Mon.)

XII. Krankheiten d. männlichen Geschlechtsorgane.

Epididymitis

Complic.: Meningitis purulenta (Knabe von 10 Mon.)

XIII. Krankheiten der Haut.

Furunculosis

Complic.:

Pneumonia cat. 3

Pneum. suppur. 1

Pleuritis 1

Gastro-Enteritis 3

Atrophia inf. 3

Phlegmone 2

Erysipel 3

ohne Complic. 3

mit Nebenkrankh.

Rachitis 1

Lues congenit. 1

Total 21

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0 — $\frac{1}{2}$	7	8	15
$\frac{1}{2}$ — 1	4	2	6
3 — 4	—	—	—
	11	10	21

Pemphigus foliac.

Complic.-Sepsis (Knabe von 5 Mon.)

Abscess d. Glutealgegend (Decubitus)

Complic.:

Peritonitis purul. (Knabe von 10 Mon.)

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— ¹ / ₂	9	5	14
¹ / ₂ —1	9	2	11
2—4	2	1	3
5—9	—	—	—
	20	8	28

Ekzem.

1. Ekzema capil. und faciei

Complic.:

Pneumonie	1
Nephritis par.	1
Eitrige Entzündung der Halslymphdrüsen	1
ohne Complic.	2
Total	5

2. Ekzema capil.

Complic.:

Pneum. catar.	1
Pneum. und Otitis media	1
ohne Complic.	4
Total	6

3. Ekzema faciei

1

4. Ekzema universale

Complic.:

Pneum. catar.	5
Nephritis par.	1
Gastro-Enteritis	6
ohne Complic.	4
Total	16

XIV. Krankheiten d. Knochensystems.

Ostitis. Periostitis ohne tuberculosa

os temporale	2
(Complic. Meningitis purul.)	
Ulnae (Complic. Sepsis)	1
Scapulae	1
Costalis	1
(Complic. Pneum. u. Empyema Pleurae)	
Periostitis sup. (Ursache Variola)	1
Total	6

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0— ¹ / ₂	—	—	—
¹ / ₂ —1	—	2	2
2—4	2	1	3
5—9	—	—	—
10—14	—	—	—
15—20	—	1	1
	2	4	6

XV. Tumoren.

Maligne Tumoren:

Sarcoma renis	2
Cystosarkoma renis	1
Myosarcoma ovarii	1
Angiosarcoma faciei	1

Osteosarcoma:

os. parietalae mit Complic.	
Sarcomatosis univers.	1
os. petrosi mit Complic.	
leptomeningitis basil.	1
femoris	2
tibiae	1
metatarsi	1
Cystosarcoma musculi tricipitis	1
Sarcoma cerebri	1
Sarcoma des colon Transversum	
mit Comp. Peritonitis	1

Total 14

Nach dem Alter.

Jahre	m.	w.	Sa.
0 — 1/2	1	—	1
1/2 — 1	2	1	3
2 — 4	4	2	6
5 — 9	1	1	2
10 — 14	—	2	2
	8	6	14

Benigne Tumoren

Struma mit Complic. Compressio d. Larynx 2 (Knabe v. 1 und Mädchen von 15 Jahren).	
Cystofibroma d. Axilla und ovarii mit hochgradiger Anaemie 1 (Mädchen von 3 Mon.)	
Cystis submandibularis mit Complic. Enteritis chron. 2 (Mädchen von 0 — 6 Mon.)	
Hygroma colli congenita Complic. Tracheobronch. und Atelect. pulm. 1 (Mädchen von 1 1/2 Jahr).	
Haemangioma purul. d. Oberschenkel 1 (Mädchen, 1 Jahr).	
Hämatoma cranii Complic. Meningitis 1 (Mädchen, 4 Mon.)	
Total	8

Schlussfolgerung.

Aus obiger Zusammenstellung ist ersichtlich:

1. Dass die grösste Zahl der Sterbefälle die Infektionskrankheiten aufwiesen, und bis zu den letzten Jahren am meisten die Diphtherie.
2. Dass die meisten Sterbefälle auf das Alter von 0-5 inclusiv fallen.

Wenn wir die Prozentzahl der gestorbenen Kinder im Vergleich zu den aufgenommenen ausrechnen, so kommen wir zum folgenden Schluss.

Jahre	Die Zahl d. neu auf- genommenen Patienten	Die Zahl v. letzten Jahre ver- bliebenen	Die Gesamt- zahl der im Spital vor- handenen Patienten	Die Zahl d. in diesen Jahren ge- storb. Pat.	% der ge- storb. Pat. zur Gesamt- zahl
1874	137	—	134	12	9
75	163	16	179	26	14,52
76	184	21	205	26	12,68
77	188	22	210	22	10,47
78	188	21	209	30	14,35
79	164	24	188	32	17,6
80	195	18	213	53	24,88
81	260	16	276	48	17,35
82	225	26	251	49	19,52
83	228	23	251	42	16,73
84	241	38	279	44	15,77
85	231	23	254	40	15,74
86	242	30	272	51	15,07
87	226	38	264	24	9,09
88	241	41	282	34	12,07
89	289	36	325	43	13,23
90	285	33	318	32	10,06
91	307	46	353	40	11,33
92	341	40	381	55	14,43
93	367	47	414	52	12,56
94	397	44	441	56	12,69
95	482	46	528	57	10,79
96	540	57	597	85	12,56
97	457	57	514	63	12,25
98	449	51	500	59	11,8
99	461	53	514	64	12,51
1900	496	52	548	56	10,22
1901	455	50	505	51	10,09
1902	513	57	570	66	11,57
1903	556	58	614	61	9,91
1904	656	74	730	75	10,27
1905	326	65	391	66	16,62

Zum Schluss gestatte ich mir, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. O. Wyss, für die Ueberlassung des Materials und freundliche Anleitung zur Bearbeitung desselben, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.